

FICHA TÉCNICA

Masterlure® Lasioderma**DESCRIPCIÓN GENERAL E INSTRUCCIONES DE USO.**

Masterlure® Lasioderma es un sistema de monitoreo que permite atraer a adultos de *Lasioderma serricorne*, mejor conocido como gorgojo del tabaco, considerada como plaga que ataca al tabaco y ciertos productos almacenados.

El atrayente es efectivo para la siguiente especie: ***Lasioderma serricorne***

CONTENIDO DEL ENVASE: 25 trampas adhesivas, sobre con 25 septos de caucho y 25 cinchos.

RECOMENDACIONES DE MONITOREO:

1. Trampas: Retire el liner de las trampas adhesivas y con una guante tome un septo de la bolsa de aluminio y coloque donde se encuentra marcado un círculo, proceda al armado de la trampa.
2. Colocación: Sitúe las trampas en áreas donde se sospeche o haya evidencia de la presencia de *Lasioderma serricorne* a una distancia de 1.5 m de altura, como despensas, almacenes, estibas o cerca de productos almacenados susceptibles.
3. Distancia: Coloca las trampas a una distancia razonable entre sí para una cobertura efectiva. La distancia recomendada para 2 esquemas:
 - a) Monitoreo para confirmación de presencia: 30 a 40 metros entre cada trampa.
 - b) Trampeo masivo: 20 a 25 metros entre cada trampa.
4. Periodo de Monitoreo: Deja las trampas en su lugar y realizar cambios dependiendo del grado de infestación. Para infestaciones bajas de 2 a 3 semanas. Para infestaciones altas o moderadas el monitoreo semanal es ampliamente recomendable.
5. Monitoreo: Realiza la primera revisión a las 24 horas de iniciar con el monitoreo. Si no hay captura, revisiones periódicas de las trampas (cada 7 a 14 días), esto proporcionará información sobre la actividad de adultos y la efectividad del control.

6. Registro de Datos: Se sugiere lleva un registro de las capturas, incluyendo:

- a) La cantidad de *Lasioderma serricorne* adultas capturadas
- b) La frecuencia de revisión (semanal, quincenal, mensual, etc.).
- c) Nombre, fecha y ubicación de trampa.

MANTENIMIENTO DE TRAMPAS:

Revise las trampas regularmente y reemplace las trampas adhesivas cuando se llenen de polvo o insectos.

ALMACENAMIENTO:

Mantener los septos lejos de la exposición directa a la luz solar, altas temperaturas, chispas y llamas. Guarda en frío (no menor a 4°C) para preservar durante un periodo aproximado de 12 meses o en un congelador (al menos -20°C) para extender su vida útil a 24 meses. Asegúrate de almacenarlo siempre sellado en su envase original.